

Utmaningar löser man bäst som ett lag

När hund, ägare och vårdpersonal samarbetar drar Cushings det kortaste strået.



Mer information: www.dechra.se

Vetoryl 5 mg, 10 mg, 30 mg, 60 mg och 120 mg hård kapsel. Rx. Aktiv substans: Trilostan. **ATC-vet kod:** QH02CA01.
Djurslag: Hund. För behandling av hypofys- och binjurerelaterad överfunktion av binjurebarken (Cushings syndrom).
Skall inte användas på djur som lider av primär leversjukdom och/eller njurinsufficiens. Eftersom diagnosen hyperadrenokorticism i de flesta fall ställs för hundar mellan 10 och 15 år förekommer ofta andra sjukdomar. Noggrann övervakning bör ske under behandlingen, eftersom hundar kan vara känsliga för verkningarna av trilostan. **Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur:** Kvinnor som är eller planerar att bli gravida bör undvika att hantera kapslarna. Tvätta händerna med tvål och vatten efter oavsiktlig exponering och efter användning. Kapslarna får inte delas eller öppnas. **Biverkningar:** Symtom som tyder på underfunktion av binjurebarken som t.ex. svaghet, sömnlöshet, aptitlöshet, kräkningar och diarré kan uppträda, särskilt om övervakningen inte är adekvat. Akut addisonkris kan också inträffa. **Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner:** Möjligheten av interaktioner med andra läkemedelsprodukter har inte studerats specifikt. Dos och administrerings sätt: Medicinen ges per oralt en gång per dag tillsammans med mat. Startdosen för behandling är ca 2 mg/kg, baserat på tillgängliga kombinationer av kapselstorlekar. Titrera dosen utefter det individuella svaret, vilket bestäms via övervakning. För detaljerad information om övervakning och uppföljning, kontakta tillverkaren eller läs mer i SPC alt.fass.se.
Förpackningsinformation: 30 st kapslar. **Innehavare av godkännande för försäljning:** Dechra Regulatory B.V. **Senast översyn av SPC:** 2020-12-23. **För ytterligare information, vänligen se www.fass.se eller www.dechra.se.**

Dechra Veterinary Products AB technical.nordic@dechra.com
www.dechra.se ©Dechra Veterinary Products A/S September 2023

The Vetoryl logo features a white silhouette of a running dog above the word 'VETORYL' in a bold, sans-serif font, followed by a registered trademark symbol (®).

Cushings syndrom

- bedömning av kliniska symtom

Visar hunden tecken på att inte må bra?

Visar hunden tecken på dåligt kontrollerad sjukdom?

Törst/urinering



Utseende



Aptit




Aktivitetsnivå



Livskvalitet – QoL

Bedöm situationen individuellt, både ur patient- och ägarperspektiv.

Använd ett vetenskapligt validerat verktyg, CushQoL-pet, för att hjälpa dig i er kommunikation.



Klinisk undersökning

Ett utmärkt tillfälle att leta efter symtom på att hunden inte mår bra och/eller kan ha samtidig annan sjukdom.

Du kan också få en uppfattning om att det djurägaren rapporterar verkar överensstämma med din kliniska bedömning.

Kortisolmätning



Min patient mår inte bra (kräkning, diarré, inappetens)

ACTH-stimuleringstest



Min patient har symtom på Cushings syndrom

Pre-Vetoryl kortisoltest



Min patient mår bra

Pre-Vetoryl kortisoltest

Då Pre-Vetoryl kortisolmätning ej anges i produktresumén för Vetoryl, är samtycke och förståelse mellan vårdgivare och djurägare ett måste, då det är en off-label rekommendation.